
SUR L'IRRÉDUCTIBILITÉ DE QUELQUES VARIÉTÉS D'IGUSA

par

Boyer Pascal

Résumé. — On prouve que les variétés d'Igusa de seconde espèce définies par Harris et Taylor dans leur livre [2], sont aussi connexes que possible, i.e. que les composantes connexes sont naturellement en bijection avec les caractères du groupe des inversibles de l'ordre maximal de l'algèbre à division centrale qui lui est attachée.

Abstract (On irreducibility of somme Igusa varieties). — We describe the connected components of Igusa's varieties of second species defined par Harris and Taylor in their book [2]. There are in bijection with the characters of the inversible group of the maximal order of the division algebra attached to them.

Table des matières

Introduction.....	1
1. Rappels sur les variétés de Shimura associés à certains groupes unitaires et sur les variétés d'Igusa associées.....	2
1.1. Variétés de Shimura simples.....	2
1.2. Variétés d'Igusa de première espèce.....	2
1.3. Variétés d'Igusa de seconde espèce.....	3
2. Systèmes locaux d'Harris-Taylor : groupes de cohomologie.....	3
2.1. Définition.....	3
2.2. Faisceaux pervers d'Harris-Taylor.....	3
2.3. Preuve des théorèmes (1.2.1) et (1.3.2).....	4
Références.....	5

Introduction

A l'origine de cette note est une question posée par J. Tilouine à L. Fargues sur l'irréductibilité des variétés d'Igusa de seconde espèce, qui lui répond que cela découle de mon travail [1]. Malheureusement l'énoncé ne se trouve pas tel quel dans loc. cit. d'où cette note qui ne contient strictement rien de nouveau mais qui rassemble les résultats nécessaires à la preuve.

Classification mathématique par sujets (2000). — 14G22, 14G35, 11G09, 11G35, 11R39, 14L05, 11G45, 11Fxx.

Mots clefs. — Variétés de Shimura, modules formels, correspondances de Langlands, correspondances de Jacquet-Langlands, faisceaux pervers, cycles évanescents, filtration de monodromie, conjecture de monodromie-poids.

1. Rappels sur les variétés de Shimura associés à certains groupes unitaires et sur les variétés d'Igusa associées

1.1. Variétés de Shimura simples. — On considère les variétés de Shimura simples associées à des groupes unitaires telles qu'elles sont définies dans [2]. On reprend les notations de [1]. Soit $F = F^+E$ un corps CM, $E/\mathbb{Q}$ quadratique imaginaire pure, dont on fixe un plongement réel $\tau : F^+ \hookrightarrow \mathbb{R}$. Le groupe unitaire G_τ est alors tel que

$$- G_\tau(\mathbb{R}) \simeq U(1, d-1) \times U(0, d)^{r-1};$$

- $G_\tau(\mathbb{Q}_p) \simeq (\mathbb{Q}_p^\times \times \prod_{i=1}^r (B_{v_i}^{op})^\times)$ où $v = v_1, v_2, \dots, v_r$ sont les places de F au dessus de la place u de E telle que $p = u^c u$ et où B est une algèbre à division centrale sur F de dimension d^2 vérifiant certaines propriétés, cf. [2], dont en particulier d'être soit décomposée soit une algèbre à division en toute place et décomposée à la place v .

1.1.1 — Pour tout sous-groupe compact U^p de $G_\tau(\mathbb{A}^{\infty, p})$ et $m = (m_1, \dots, m_r) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^r$. On pose

$$U^p(m) = U^p \times \mathbb{Z}_p^\times \times \prod_{i=1}^r \text{Ker}(\mathcal{O}_{B_{v_i}}^\times \longrightarrow (\mathcal{O}_{B_{v_i}}/v_i^{m_i})^\times)$$

Pour U^p assez petit on dispose d'un schéma projectif sur $\text{Spec } \mathcal{O}_v$ tel que quand U varie, les $X_{U^p(m)}$ forment un système projectif dont les morphismes de transition sont finis et plats : quand $m_1 = m'_1$ ils sont en plus étales. Le système projectif $(X_{U^p(m)})_{U^p, m}$ est naturellement muni d'une action de $G_\tau(\mathbb{A}^\infty)$.

Étant donné une représentation irréductible ξ de G sur $\overline{\mathbb{Q}_l}$, on notera $\mathcal{L}_\xi$ le système local sur $X_{U^p(m)}$.

1.1.2 — On note $\overline{X}_{U^p, m}$ la fibre spéciale de $X_{U^p(m)}$. Pour tout $0 \leq h \leq d-1$, on dispose d'une strate fermée (resp. ouverte) notée

$$\overline{X}_{U^p, m}^{\geq d-h} = \overline{X}_{U^p, m}^{[h]} \quad (\text{resp. } \overline{X}_{U^p, m}^{=d-h} = \overline{X}_{U^p, m}^{(h)})$$

de pure dimension h et munie d'une action de $G(\mathbb{A}^\infty)$. Dans le cas de bonne réduction, i.e. $m_1 = 0$, elles sont en outre lisses. Pour tout $0 < h < d$, les strates $\overline{X}_{U^p, m}^{(h)}$ sont géométriquement induites sous l'action du parabolique $P_{h, d}(\mathcal{O}_v)$, au sens où il existe un sous-schéma fermé $\overline{X}_{U^p, m, 0}^{(h)}$ tel que

$$\overline{X}_{U^p, m}^{(h)} \simeq \overline{X}_{U^p, m, 0}^{(h)} \times_{P_M(\mathcal{O}_v/v^{m_1})} GL_d(\mathcal{O}_v/v^{m_1})$$

On notera $\overline{X}_{U^p, m, 0}^{[h]}$ l'adhérence de $\overline{X}_{U^p, m, 0}^{(h)}$ dans $\overline{X}_{U^p, m}^{[h]}$.

1.2. Variétés d'Igusa de première espèce. — Dans [2], les auteurs définissent les variétés d'Igusa de première espèce $I_{U^p, m}^{(h)} \longrightarrow \overline{X}_{U^p, \overline{m}}^{(h)}$, où $\overline{m} = (0, m_2, \dots, m_r)$, qui est l'espace des modules des isomorphismes

$$\alpha_1^{et} : (\varpi^{-m_1} \mathcal{O}_v / \mathcal{O}_v)^h \times \overline{X}_{U^p, \overline{m}}^{(h)} \simeq \mathcal{G}^{et}[\varpi^{m_1}]$$

On obtient ainsi un revêtement galoisien de $\overline{X}_{U^p, \overline{m}}^{(h)}$ de groupe de Galois $GL_h(\mathcal{O}_v/\varpi^{m_1})$. Ils définissent en outre un morphisme radiciel de $I_{U^p, m}^{(h)}$ sur $\overline{X}_{U^p, m, M}^{(h)}$ pour tout M .

Ces variétés $I_{U^p, m}^{(h)}$ sont munies d'une action de

$$G_h^+(\mathbb{A}^\infty) = G_\tau(\mathbb{A}^{\infty, p} \times \mathbb{Q}_p^\times \times P_{d-h, d}(F_v) \times \prod_{i=2}^r (B_{v_i}^{op})^\times)$$

qui agit via le quotient $G_h^+(\mathbb{A}^\infty) \longrightarrow G_\tau(\mathbb{A}^{\infty, p}) \times \mathbb{Q}_p^\times \times (\mathbb{Z} \times GL_h(F_v))^+ \times \prod_{i=2}^r (B_{v_i}^{op})^\times$ où $(\mathbb{Z} \times GL_h(F_v))^+$ désigne le sous-semi-groupe de $\mathbb{Z} \times GL_h(F_v)$ formé des éléments (c, g) tels que $\varpi_o^{\lfloor -c/(n-h) \rfloor} g \in GL_h(\mathcal{O}_v)$ qui est induit par la surjection $P_{d-h, d}(F_v) \longrightarrow \mathbb{Z} \times GL_h(F_v)$ qui à $g_v = g_M(g_v^c, g_v^{et})g_M^{-1}$ associe $(v(\det g_v^c), g_v^{et})$.

1.2.1. Théorème. — Pour tout $0 < h < d$, $I_{U^p, m}^{(h)}$ est géométriquement connexe.

1.3. Variétés d'Igusa de seconde espèce. — Soit S un schéma et H un $\mathcal{O}_v$ -module de Barsotti-Tate compatible de dimension 1 et de hauteur constante h . On considère comme dans [2], le foncteur en S -schémas qui à T/S associe l'ensemble des T -isomorphismes

$$\Sigma_h[\varpi^m] \times_{\text{Spec } \overline{\mathbb{F}}_p} T \longrightarrow H[\varpi^m] \times_S T$$

où Σ_h est "le" $\mathcal{O}_v$ -module de Barsotti-Tate formel de hauteur h sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. Ce foncteur est représenté par un S -schéma $X_m(H/S)$ de type fini sur S et on note $Y_m(H/S)$ l'intersection des images schématiques de

$$X_{m'}(H/S) \longrightarrow X_m(H/S)$$

pour $m' \geq m$ et on pose $J^{(m)}(H/S) = Y_m(H/S)^{\text{red}}$.

Soit $\mathcal{G}^0/I_{U^p,m}^{(h)}$ le $\mathcal{O}_v$ -module de Barsotti-Tate formel universel : il est de dimension 1 et de hauteur constante h . On définit alors

$$J_{U^p,m,s}^{(h)} := J^{(s)}(\mathcal{G}^0/I_{U^p,m}^{(h)})$$

Le revêtement $J_{U^p,m,s}^{(h)} \longrightarrow I_{U^p,m}^{(h)} \times \text{Spec } \overline{\mathbb{F}}_p$ est galoisien de groupe de Galois $(\mathcal{D}_{v,d-h}/\varpi^s)^\times$ où $\mathcal{D}_{v,d-h}$ est l'ordre maximal de l'algèbre à division $D_{v,d-h}$ de centre F_v et d'invariant $1/(d-h)$.

Par ailleurs, on a, sur la tour des $J_{U^p,m,s}^{(h)}$ une action par correspondances du groupe $G_\tau(\mathbb{A}^{\infty,p}) \times \mathbb{Q}_p^\times \times (\mathbb{Z} \times GL_h(F_v))^+ \times \prod_{i=2}^r (B_{v_i}^{op})^\times \times (D_{v,d-h}^\times / \mathcal{D}_{v,d-h}^\times)$.

1.3.1. Définition. — Soit $\mathcal{D}_{v,d-h}^1$ le noyau de la norme réduite de $D_{v,d-h}^\times$. Pour tout $m \geq 0$, on note alors $\mathcal{D}_{v,d-h,m}^1 := \mathcal{D}_{v,d-h}^1 / (1 + \varpi^s)$ et soit $J_{U^p,m,s}^{(h),1} := (J_{U^p,m}^{(h)})^{\mathcal{D}_{v,d-h,m}^1}$.

1.3.2. Théorème. — Pour tout $0 < h < d$, $J_{U^p,m}^{(h)} \longrightarrow J_{U^p,m}^{(h),1}$ est un $\mathcal{D}_{v,d-h,m}^1$ -torseur géométriquement irréductible au dessus de toute composante géométriquement connexe et

$$J_{U^p,m}^{(h),1}(\overline{\mathbb{F}}_p) \simeq I_{U^p,m}^{(h)}(\overline{\mathbb{F}}_p) \times \mathcal{D}_{v,d-h,m} / \mathcal{D}_{v,d-h,m}^1$$

où l'action est induite par l'action du groupe de Galois $\mathcal{D}_{v,d-h,m}$ du revêtement $J_{U^p,m}^{(h)} \longrightarrow I_{U^p,m}^{(h)}$.

2. Systèmes locaux d'Harris-Taylor : groupes de cohomologie

2.1. Définition. — Les variété d'Igusa de seconde espèce définissent pour toute représentation irréductible admissible ρ_v des inversibles $D_{v,d-h}^\times$, un système local $\mathcal{F}_{\rho_v, U^p(m), 0}$ sur $I_{U^p, \overline{m}}^{(h)}$ et donc sur $\overline{X}_{U^p, m, 0}^{(d-h)}$. Tout élément $(g^p, g_{p,0}, c, g_o^{et}, g_{o_i}, \delta)$ de $G_\tau(\mathbb{A}^{\infty,p}) \times \mathbb{Q}_p^\times \times (\mathbb{Z} \times GL_{d-h}(F_v))^+ \times \prod_{i=2}^r (B_{v_i}^{op})^\times \times (D_{v,d-h}^\times / \mathcal{D}_{v,d-h}^\times)$ définit naturellement un morphisme

$$(g^p, g_{p,0}, c, g_v^{et}, g_{v_i}, \delta) : (g^p, g_{p,0}, c, g_v^{et}, g_{v_i}, \delta)^* (\mathcal{F}_{\rho, M} \otimes \mathcal{L}_\xi) \longrightarrow \mathcal{F}_{\rho, M} \otimes \mathcal{L}_\xi$$

2.1.1. Définition. — Pour τ_v une $\overline{\mathbb{Q}}_l$ -représentation irréductible admissible de $D_{v,h}^\times$, on note

$$\mathcal{F}_{\tau_v} := \mathcal{F}_{\tau_v, 0} \times_{P_{h,d}(\mathcal{O}_v/v^{m_1})} GL_d(\mathcal{O}_v/v^{m_1})$$

le faisceau induit sur toute la strate $\overline{X}_{U^p, m}^{(d-h)}$, où l'action de $\begin{pmatrix} g_v^c & * \\ 0 & g_v^{et} \end{pmatrix} \in P_{h,d}(F_v)$ est donnée par celle de $(\text{val}(\det g_v^c), g_v^{et}) \in \mathbb{Z} \times GL_{d-h}(F_v)$.

2.2. Faisceaux pervers d'Harris-Taylor. — On introduit suivant [1], les faisceaux pervers dits de Harris-Taylor

$$\mathcal{P}(g, t, \pi_v) = j_{!*}^{\geq tg} HT(g, t, \pi_v, [\overleftarrow{t-1}]_{\pi_v})[d - tg] \otimes \text{rec}_{F_v}^\vee(\pi_v)$$

où $HT(g, t, \pi_v, \Pi) = \mathcal{F}_{\text{JL}^{-1}([\overleftarrow{t-1}]_{\pi_v})} \otimes \Pi$. On rappelle le résultat suivant de [1].

2.2.1. Proposition. — Pour tout $1 \leq t \leq s$, la filtration par les poids de $j_!^{\geq tg} HT(g, t, \pi_v, \Pi_t)[d - tg]$ est telle que ses gradués $gr_{t,k}$ sont nuls pour $k < 0$ et pour $0 \leq k \leq s - t$, égaux à

$$j_{!*}^{\geq (t+k)g} HT(g, t+k, \pi_v, \Pi_t \overleftarrow{\times} [\overleftarrow{k-1}]_{\pi_v})[d - (t+k)g] \otimes \Xi^{k(g-1)/2}$$

où $\Xi : \mathbb{Z} \longrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^\times$ désigne le caractère défini par $\Xi(1) = \frac{1}{t}$

2.3. Preuve des théorèmes (1.2.1) et (1.3.2). — Pour tout τ_v et pour tout i ,

$$H_{\tau_v,0}^i := H^i(\varinjlim_{U^p,m} \overline{X}_{U^p,m,0}^{(d-h)}, \mathcal{F}_{\tau_v,0})$$

est une représentation admissible de $G(\mathbb{A}^{\infty,o}) \times GL_h(F_v) \times \mathbb{Z}$ telle que pour toute représentation Π_h de $GL_{d-h}(F_v)$, on a

$$H_{\tau_v}^i(\Pi) := H^i(\varinjlim_{U^p,m} \overline{X}_{U^p,m}^{(d-h)}, \mathcal{F}_{\tau_v} \otimes \Pi_h) \simeq \text{Ind}_{P_{h,d}(F_v)}^{GL_d(F_v)} (H_{\tau_v,0}^i \otimes \Pi_h)$$

où l'action de $\begin{pmatrix} g_v^c & * \\ 0 & g_v^{et} \end{pmatrix} \in P_{h,d}(F_v)$ sur $H_{\tau_v,0}^i \otimes \Pi$ est donnée par l'action de $(\text{val}(\det g_v^c), g_v^{et}) \in \mathbb{Z} \times GL_{d-h}(F_v)$ sur $H_{\tau_v,0}^i$ et par celle de g_v^c sur Π_h . Les théorèmes (1.2.1) et (1.3.2) découlent classiquement du résultat suivant.

2.3.1. Proposition. — Pour tout τ_v , $H_{\tau_v,0}^0$ est nul sauf si τ_v est un caractère χ_v auquel cas on obtient

$$\chi_v \otimes \Xi^0$$

en tant que représentation de $GL_{d-h}(F_v) \times \mathbb{Z}$.

Démonstration. — On rappelle qu'une représentation automorphe Π de $G_\tau(\mathbb{A})$ est dite cohomologique, s'il existe une certaine représentation algébrique ξ sur $\mathbb{C}$ de la restriction des scalaires de F à $\mathbb{Q}$ de GL_g , et un entier i tels que

$$H^i((\text{Lie} G_\tau(\mathbb{R})) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}, U_\tau, \Pi_\infty \otimes (\xi')^\vee) \neq (0)$$

où U_τ est un sous-groupe compact modulo le centre de $G_\tau(\mathbb{R})$, maximal, cf. [2] p.92, et où ξ' est le caractère sur $\mathbb{C}$ associé à ξ via un isomorphisme $\overline{\mathbb{Q}}_l \simeq \mathbb{C}$ fixé. Considérons Π irréductible et cohomologique, les faits suivants se trouvent dans [1] :

- si Π n'est pas cohomologique alors $H_{\tau_v,0}^i[\Pi^{\infty,v}]$ est nul pour tout i et tout τ_v ;
- pour Π cohomologique tel que $\Pi_v \simeq \text{Sp}_s(\pi_v)$, pour $d = sg$ avec π_v une représentation irréductible cuspidale de $GL_g(F_v)$, $H_{\text{JL}^{-1}(\text{Sp}_t(\pi_v)),0}^i$ est donné par

$$\begin{cases} 0 & \text{si } i \neq 0 \\ \# \text{Ker}^1(\mathbb{Q}, G_\tau)m(\Pi)[\overleftarrow{s-t-1}]_{\pi_v(-t(g-1)/2)} \otimes (\Xi^{\frac{(s-t)(g-1)}{2}} \otimes \bigoplus_{\chi \in \mathfrak{A}(\pi_v)} \xi^{-1}) & i = 0 \end{cases}$$

où $\mathfrak{A}(\pi_v)$ est l'ensemble des caractères $\chi : \mathbb{Z} \longrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_l^\times$, tels que $\pi_v \otimes \chi^{-1} \circ \text{val}(\det) \simeq \pi_v$.

- pour Π cohomologique tel que $\Pi_v \simeq \text{Sp}_s(\pi_v)$, pour $d = sg$ avec π_v une représentation irréductible cuspidale de $GL_g(F_v)$, $H_{\text{JL}^{-1}(\text{Sp}_t(\pi_v)),0}^i$ est donné par

$$\begin{cases} 0 & \text{si } i \neq s-t \\ \# \text{Ker}^1(\mathbb{Q}, G_\tau)m(\Pi)[\overrightarrow{s-t-1}]_{\pi_v(-t(g+1)/2)} \otimes (\Xi^{\frac{(s-t)(g+1)}{2}} \oplus_{\chi \in \mathfrak{A}(\pi_v)} \chi^{-1}) & i = s-t \end{cases}$$

- pour Π cohomologique telle que Π_v n'est pas d'une des deux formes précédentes, d'après loc. cit., Π_v est alors de la forme

$$[\overrightarrow{s_1-1}]_{\pi_{v,1}} \times \cdots \times [\overrightarrow{s_u-1}]_{\pi_{v,u}} \times [\overleftarrow{t_1-1}]_{\pi'_{v,1}} \times \cdots \times [\overleftarrow{t_{u'}-1}]_{\pi'_{v,u'}}$$

avec $\pi_{v,i}$ et $\pi'_{v,j}$ irréductibles cuspidales unitaires de respectivement $GL_{g_i}(F_v)$ et $GL_{g'_j}(F_v)$.

(1) On a alors prouvé dans loc. cit. que

$$H^0(\lim_{U^p, m} \overline{X}_{U^p, m}^{[d-h]}, \mathcal{P}(g, t, \pi_v))[\Pi^{\infty, v}] = 0.$$

En utilisant la suite spectrale associée à la filtration par les poids de $j_!^{\geq tg} HT(g, t, \pi_v, [\overleftarrow{t-1}]_{\pi_v})[d-tg]$, on en déduit que

$$H_{\tau_v}^0([\overleftarrow{t-1}]_{\pi_v})[\Pi^{\infty, v}] = 0$$

et donc que $H_{\tau_v, 0}^0[\Pi^{\infty, v}] = 0$, d'où le résultat.

□

Références

- [1] Pascal Boyer. Monodromie du faisceau pervers des cycles évanescents de quelques variétés de shimura simples et applications. *Preprint*, 2005.
- [2] M. Harris, R. Taylor. *The geometry and cohomology of some simple Shimura varieties*, volume 151 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2001.

BOYER PASCAL • *E-mail* : boyer@math.jussieu.fr, Institut de mathématiques de Jussieu, UMR 7586, université Paris 6, 175 rue du Chevaleret Paris 13

(1) En outre tous les s_i ont la même congruence modulo 2.